

GYNDOKTOR

SPECIALLÆGE DR. MED. PERNILLE DANNESKIOLD LASSEN

KEGLESNIT

HVORNÅR FÅR MAN FORETAGET ET KEGLESNIT?


Du er blevet indstillet til et keglesnit (conisatio), fordi der er konstateret celleforandringer på livmoderhalsen. Det er vigtigt at understrege, at sådanne celleforandringer IKKE er kræft. Stort set alle kvinder, der får konstateret celleforandringer, bliver fuldstændig helbredt.

Celleforandringer opstår oftest i slimhinden på ydersiden af livmoderhalsen, men kan også ses i de slimproducerende kirtelceller i livmoderhalskanalen. De kan opdeles i *lette*, *moderate* og *svære* forandringer samt *carcinoma in situ*. Det er normalt kun svære celleforandringer og *carcinoma in situ*, der behandles med keglesnit. Celleforandringer skyldes en persisterende infektion med høj-risiko typer af humant papillom virus. (HR-HPV). Både virusinfektionen og celleforandringerne er ofte symptomløse og bliver opdaget ved rutinescreening.

INDGREBET

Vi anbefaler, at du tager smertestillende medicin, før du tager hjemmefra, for

eksempel 1 gram Panodil og 400 mg Ipren. Indgrebet foregår gennem skeden, mens du ligger på det gynækologiske leje. Der bliver anlagt lokalbedøvelse omkring livmoderhalsen med en tynd nål. Det er kun de første stik, du vil kunne mærke. Herefter vil du ikke kunne føle smerte. Du vil hele tiden kunne mærke, at der bliver rørt ved dig, men smertesansen er bedøvet.



Når bedøvelsen virker, udskæres et kegleformet vævsstykke fra livmoderhalsen med en elektrisk slynge (loop). Dette tager mindre end 15 sekunder. Eventuel blødning stoppes umiddelbart efter med brænding (koagulering) af sårfladen. Dette vil du heller ikke kunne mærke. Hele indgrebet varer sædvanligvis 10-15 minutter. Selve keglen bliver sendt til mikroskopisk

GYNDOKTOR

SPECIALLÆGE DR. MED. PERNILLE DANNESKIOLD LASSEN

KEGLESNIT

undersøgelse på patologisk afdeling. Her undersøges graden af celleforandringer og hvorvidt der er frie *resektionsrande* (det vil sige om celleforandringerne er fjernet i sundt væv. Selv hvis resektionsrandene ikke er frie, vil den efterfølgende koagulering ofte fjerne restforandringerne. Kontrollen vil derfor under alle omstændigheder være en almindelig celleprøve efter 6 måneder.

EFTER INDGREBET

For at være helt sikker på, at sårfladen er tør, skal du sidde 15-20 minutter i venteværelset. Herefter kan du gå hjem. Der kan være småblødninger eller brunligt udflåd fra skeden i op til 14 dage efter operationen. Efter en uge kan der komme en ny blødning, når sårskorpen løsnes og afstødes. Efter 3-6 uger er livmoderhalsen helet op, og ny slimhinde dækker området, hvor keglen er fjernet.

Der er ingen egentlig sygdommelding. For at give såret ro til at hele bør du dog undlade tunge løft og anden fysisk anstrengelse i en uge efter indgrebet. Du bør ligeledes undgå samleje, karbad, svømning og brug af tamponer i en måned.

Hvis der indenfor det første døgn opstår kraftig, frisk blødning, kraftige smerter eller temperaturforhøjelse, skal du kontakte vagtlægen. Der kan i enkelte tilfælde være behov for fornyet koagulering svarende til livmoderhalsen.

RESULTAT

Resultatet af keglesnittet vil være tilgængeligt efter 1-2 uger, hvor du vil modtage en besked over Lægevejen eller på mail. Den opfølgende celleprøve efter 6 måneder vil i de fleste tilfælde allerede være aftalt i forbindelse med indgrebet.

PRIS UDEN DANSK CPR-NUMMER

.....9000 DKR

BETALING

Du kan betale kontant eller med Mobile Pay i receptionen. Desværre kan vi ikke tage imod kreditkort. Alternativt kan foretages en bankoverførsel til reg. nr. 7690701633 002904. I så fald skal overførslen finde sted senest to dage før indgrebet. Du vil få udleveret en faktura i receptionen efter indgrebet.